

PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“
direktorius
2023 m. birželio 1 d.
įsakymu Nr. V-27-(1.2)

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą, teikimą ir atsakomybę Alytaus Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ (toliau – Lopšelis-darželis).


2. Aprašo nuostatas įgyvendina Lopšelio-darželio darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo; 2010 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

II SKYRIUS BENDRIEJI PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

4. Pirmoji pagalba – tai paprasti tikslingi veiksmai, naudojant turimas pirmosios pagalbos teikimo priemones ar kitokias priemones bei medžiagas, siekiant išsaugoti nukentėjusiojo gyvybę ar sustabdyti sveikatai žalingus veiksmus. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (toliau – VSPS), vykdamas sveikatos priežiūrą Lopšelyje-darželyje, teikia pirmąją pagalbą įstatymo nustatyta tvarka. Nesant VSPS, pirmąją pagalbą teikia pedagogai. Pedagogai nustatyta tvarka yra apmokyti suteikti pirmąją pagalbą.

5. Įvykus nelaimingam atsitikimui Lopšelyje-darželyje veikiama pagal nustatytą algoritmą (žr. pav.):



Pav.

- 5.1. kilus grėsmei vaiko gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei pirmąją pagalbą teikia asmuo, esantis arčiausiai nukentėjusiojo;
- 5.2. prieš pradėdant teikti pirmąją pagalbą, užtikrinamas situacijos saugumas;
- 5.3. įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikalinga, pagalbą teikiantis arba šalia jo esantis asmuo kviečia greitąją medicinos pagalbą;
- 5.4. jei tuo metu Lopšelyje-darželyje yra visuomenės sveikatos specialistas, vykdamas sveikatos priežiūrą (toliau – VS specialistas), jei jis yra informuojamas apie įvykį ir su pirmosios pagalbos rinkiniu atvykęs į įvykio vietą, perima pirmosios pagalbos teikimą ir (ar) organizavimą;
- 5.5. nelaimingo atsitikimo metu nukentėjęs mokinys, vienas nepaliekamas;
- 5.6. kilus grėsmei vaiko gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei mokinio atstovus informuoja grupės mokytojas;

5.7. Lopšelio-darželio administraciją informuoja pagalbą teikiantis asmuo, grupės mokytoja arba kitas šalia esantis Lopšelio-darželio darbuotojas.

5.8. jeigu organizuojant nukentėjusiojo gabenimą į sveikatos priežiūros įstaigą nepavykst susisiekti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), jį lydi Lopšelio-darželio vadovo paskirtas asmuo, lieka su juo, kol atvyks mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

6. Kiekvienas Lopšelio-darželio darbuotojas supažindinamas:

6.1. kurioje Lopšelio-darželio vietoje yra laikomi pirmosios pagalbos rinkiniai;

6.2. kokių telefono numeriu reikėtų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai situacijai, reikalaujančiai neatidėliotinių veiksmų.

7. Atvejai, kai būtina skambinti skubios pagalbos telefonu 112:

7.1. iškilus grėsmei gyvybei, sveikatai;

7.2. įtarus, kad žmogus bando nusižudyti;

7.3. aptikus sprogmenį;

7.4. smurto atveju;

7.5. kai kėsinamasi pagrobti, sugadinti ar sunaikinti turtą;

7.6. įvykus eismo įvykiui;

7.7. žmogui skęstant;

7.8. gaisro atveju.

8. Pedagoginiai darbuotojai privalo turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus ir būti išklause 8 val. trukmės pirmosios pagalbos kursų.

9. Kiekvienoje grupėje, sveikatos priežiūros kabinete privalo būti pirmosios pagalbos rinkiniai.

10. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu yra paskirtas atsakingas asmuo už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir jos papildymą.

11. Mokinių nelaimingų atsitikimų registruojami, tiriami ir apskaitomi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“ nustatyta tvarka.

12. Sužalojimų, kurių neapima Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai, registruojami „Mokinių nelaimingų atsitikimų registravimo formoje“.

III SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA KRAUJUOJANT

13. Kraujavimas gali būti išorinis (kai pažeistas odos vientisumas ir kraujuoja iš akimi matomos žaizdos) ir vidinis (tai nematomas kraujavimas į vidines kūno dalis - krūtinės, pilvo ertmės, tarp raumenų).

14. Įtarti vidinį kraujavimą reikėtų esant šiems požymiams:

14.1. nerimas;

14.2. silpnumas;

14.3. troškulys;

14.4. krečia drebulys, pila šaltas prakaitas;

14.5. žmogus išblykšta;

14.6. kvėpavimas dažnas, paviršutinis;

- 14.7. pulsas dažnas, silpnas;
- 14.8. žmogus gali prarasti sąmonę, kristi.
15. Įtarus vidinį kraujavimą, nukentėjusiajam reikėtų suteikti patogią kūno padėtį, dėti šalčio kompresus, kuo greičiau organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą.
- 16. Esant išoriniam kraujavimui:**
- 16.1. užsimauti pirštines arba panaudoti kitą skysčiui nelaidžią medžiagą;
- 16.2. nuvilkti nukentėjusiajam drabužius arba juos apkirpti, kad matytųsi kraujuojanti vieta;
- 16.3. kraujuojančią vietą užspausti tvarsčiu (jeigu sterilus tvarsčio nėra, galima panaudoti švarų audinį (nosinę, skarelę arba užspausti rankomis, nukentėjusysis gali pats, savo rankomis užspausti kraujuojančią žaizdą);
- 16.4. sutvarstyti;
- 16.5. jeigu kraujavimo sustabdyti nepavyko (krauju permirkusių tvarsčių nuimti negalima) ant viršaus dėti spaudžiamąjį tvarstį (pvz.: standžiai susuktą audinio ritinėlį);
- 16.6. kaip pagalbinę kraujavimo stabdymo priemonę galima naudoti galūnės pakėlimą arba maksimalų sulenkimą;
- 16.7. varžtu stabdyti kraujavimo nerekomenduojama;
- 16.8. kraujuojant galvos srityje, nukentėjusiojo neguldyti;
- 16.9. kraujuojant iš nosies, nukentėjusįjį reikia nuraminti, pasodinti, papašyti palenkti galvą priekį, užspausti nosies sparnelius, ant nosies kaulinės dalies ir kaktos dėti šalčio kompresus.

IV SKYTIUS PIRMOJI PAGALBA NETEKUS SĄMONĖS

- 17. Jei nėra galvos ar stuburo traumos požymių, kvėpuojantį, bet nesąmoningą nukentėjusįjį reikia:**
- 17.1. paguldyti į stabilią šoninę padėtį, ji palaiko atvirus kvėpavimo takus;
- 17.2. priklaupiti šalia nukentėjusiojo ir ištiesti jo kojas;
- 17.3. arčiau esančią ranką sulenkti per peties ir alkūnės sąnarius stačiais kampais;
- 17.4. delną atversti aukštyn;
- 17.5. kitą ranką permesti per krūtinės ląstą, prie skruosto;
- 17.6. sulenkti toliau nuo savęs esančią koją stačiu kampu per klubo ir kelio sąnarius;
- 17.7. uždėti rankas ant tolesnių peties bei klubo arba kelio sąnarių ir vienodai paversti ant šono;
- 17.8. viršutinės rankos delną pakišti po apatiniu žandu;
- 17.9. viršutinę koją sulenkti stačiu kampu;
- 17.10. atlošti galvą, taip užtikrindami atvirus kvėpavimo takus;
- 17.11. po skruostu pakišus delną galva turi būti stabili;
- 17.12. pakartotinai vertinti gyvybines organizmo funkcijas.
- 18. Svarbiausias galvos smegenų traumos požymis – sąmonės sutrikimas. Netekęs sąmonės žmogus nesugeba reaguoti į išorinius dirgiklius.**
- 19. Patyrus galvos smegenų traumą, netekus sąmonės gali:**
- 19.1. užkristi liežuvio šaknis;
- 19.2. išnykti kosulio ar rijimo refleksai;

19.3. sustoti kvėpavimas;

19.4. žmogus gali užspringti krauju, skrandžio turiniu, gali uždusti.

20. Galvos smegenų traumos požymiai:

20.1. kraujavimas iš nosies, burnos, ausies;

20.2. gelsvo ar kraujingo skysčio tekėjimas iš ausų;

20.3. nosies ar galvos žaizdos;

20.4. mėlynės aplink akis, už ausų;

20.5. galvos ar veido asimetrija, deformacija;

20.6. stiprūs galvos skausmai;

20.7. vietinis galvos audinių patinimas;

20.8. sunkėjanti sąmonės būklė arba visiškas jos netekimas;

20.9. vienos akies vyzdžio išsiplėtimas;

20.10. vienos pusės rankos ir kojos silpnumas ar paralyžius.

21. Pirmoji pagalba galvos smegenų traumos atveju:

21.1. jei nukentėjusysis sąmoningas, nuraminti ir suteikti jam patogią kūno padėtį;

21.2. kviesti grietąją medicinos pagalbą;

21.3. sekti nukentėjusiojo sąmonę, kvėpavimą ir kraujotaką;

21.4. jei yra atvira žaizda, uždėti spaudžiamąjį tvarstį;

21.5. jei sąmonės netekimas buvo trumpalaikis, nepalikti nukentėjusiojo, sekti jo būklę;

21.6. jei nukentėjusysis nesąmoningas, atverti kvėpavimo takus, pakelti apatinį žandikaulį įvertinti kvėpavimą, pasirengti prireikus daryti įpūtimus ir krūtinės ląstos paspaudimus.

22. Stuburo traumas požymiai:

22.1. skausmas kaklo ar nugaros srityje;

22.2. iškrypimas ar išsigaubimas nuo normalios stuburo ašies;

22.3. patinimas pažeidimo vietoje.

23. Kai patyrus stuburo traumą pažeistos nugaros smegenys:

23.1. išnykusi judesių kontrolė galūnėse žemiau pažeidimo;

23.2. išnykę ar nenormalūs jutimai (deginimas, dilgčiojimas), galūnė nejudri, sunki ar suglebusi;

23.3. išnykusi šlapinimosi ir tuštinimosi kontrolė;

23.4. sunku kvėpuoti.

24. Pirmoji pagalba stuburo traumas atveju (esant sąmonei):

24.1. nukentėjusiajam neleisti judėti;

24.2. kviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112;

24.3. paprašyti šalia esančiųjų iš rūbų padaryti volelius ir jais fiksuoti galvą neutralioje pozicijoje;

24.4. sekti pagrindines gyvybines funkcijas (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą).

25. Jeigu nukentėjusysis nesąmoningas, sustojo kvėpavimas ir širdies veikla, pradėti gaivinti.

Pagal galimybes reikia stengtis apsaugoti stuburą nuo judesių. Tačiau tai neturi trukdyti gaivinimui.

V SKYRIUS

PIRMOJI PAGALBA ESANT TRAUKULIAMS

26. Traukuliai atsiranda, jei sergama epilepsija, yra galvos smegenų auglys, įvykus galvos traumai, apsinuodijus įvairiomis cheminėmis medžiagomis.

27. Vaikams gali atsirasti labai stipriai karščiuojant.

28. Paprastai traukuliai prasideda netekus sąmonės ar jos netenkant. Dažniausiai traukuliai išstinka esant epilepsijos priepuoliui.

29. Epilepsijos priepuolio požymiai:

29.1. staigus rikteliųėjimas;

29.2. sustingimas;

29.3. sąmonės sutrikimas;

29.4. akių žvilgsnis į viršų ar į šoną;

29.5. ritmiški raumenų traukuliai;

29.6. veido pamėlynavimas;

29.7. kramtomieji judesiai;

29.8. nevalingas šlapinimasis;

29.9. triukšmingas kvėpavimas;

29.10. putos iš burnos.

30. Jei prasidėjus epilepsijos priepuoliui žmogus krenta, reikia pasistengti, kad kristų saugiai:

30.1. prilaikyti galvą kritimo metu ir atlaisvinti drabužius;

30.2. padėti ką nors po galva.

31. Pasibaigus traukuliams atverti kvėpavimo takus ir patikrinti kvėpavimą.

32. Esant poreikiui daromi įpūtimai ir krūtinės ląstos paspaudimai.

33. Jei nukentėjusysis kvėpuoja, jį reikia paguldyti į stabilią šoninę padėtį ir sekti jo gyvybines funkcijas.

34. Kviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112.

35. Epilepsijos priepuolio atveju:

35.1. tarp dantų nedėti jokių kietų daiktų;

35.2. neslopti traukulių fizine jėga;

35.3. nevežti į ligoninę priepuolio metu.

VI SKYRIUS

PIRMOJI PAGALBA UŽSPRINGUS

36. Žmogaus užspringimas gali būti visiškas ir dalinis.

37. Dalinio užspringimo požymiai:

37.1. žmogus išlieka sąmoningas;

37.2. žmogus gali kosėti ir kalbėti.

38. Visiško užspringimo požymiai:

38.1. nukentėjusysis negali kalbėti;

38.2. nukentėjusysis rodo visų suprantamą užspringimo ženklą (griebiasi už kaklo);

- 38.3. nukentėjusysis negali kalbėti paklaustas;
- 38.4. nukentėjusiojo kosulys silpnas, neefektyvus;
- 38.5. nukentėjusysis kvėpuojant atsirado švilpesys;
- 38.6. nukentėjusiojo žmogaus kvėpavimo nepakankamumas sunkėja;
- 38.7. nukentėjusysis pradeda mėlti;
- 38.8. nukentėjusysis netenka sąmonės.

39. Pirmoji pagalba esant daliniam užspringimui:

- 39.1. stebėti užspringusįjį;
- 39.2. nepalikti nukentėjusiojo vieno;
- 39.3. jeigu nukentėjusysis kosti, netrukdyti jam (kosulys yra geriausias svetimkūni pašalinimo iš kvėpavimo takų būdas);
- 39.4. netrankyti į nukentėjusiojo tarpumentę;
- 39.5. netaikyti Heimlich'o metodo;
- 39.6. užspringimui užtrukus, kviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112.

40. Pirmoji pagalba visiško užspringimo atveju:

- 40.1. 5 kartus suduoti į tarpumentę;
- 40.2. jei nukentėjusysis vis tiek išlieka užspringęs, pasinaudoti Heimlich'o metodu (atsistoti a atsiklaupti užspringusiajam už nugaros, apkabinti jį, rankas dėti po nukentėjusiojo pažastimis, dėt vienos rankos kumštį po krūtinkauliu, kita ranka apglėbti kumštį ir staigiu trumpu judesiu (gilyn ir viršų) spustelti 5 kartus;
- 40.3. šiuos veiksmus atlikinėti pakaitomis tol, kol žmogus atsprings arba neteks sąmonės.
- 41. Nukentėjusiajam netekus sąmonės, pradėti gaivinti.

VII SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA SUSIŽEIDUS

- 42. Žaizda – tai audinių vientisumo pažeidimas, kuriam būdingas skausmas, kraujavimas ir žiojėjimas.
- 43. **Žaizdos pavojingumas pasireiškia tuo, kad:**
 - 43.1. per žaizdą į audinius gali patekti infekcija;
 - 43.2. per žaizdą galima nukraujuoti;
 - 43.3. dėl žaizdos gali sutrikti kūno dalies ar organo funkcija;
 - 43.4. gali ištikti šokas;
 - 43.5. sužeistasis gali mirti ar likti neįgalus;
- 44. Žaizda tuo pavojingesnė, kuo ji yra arčiau gyvybiškai svarbių organų ar kuo stambesnė kraujagyslė ar nervas yra pažeisti.
- 45. Žaizdos gali būti įvairios (pjautinės, plėštinės, šautinės ir pan.). Bet kokią žaizdą būtina atidžiai apžiūrėti, sustabdyti kraujavimą sutvarstyti.
- 46. Žaizdų tvarstymas – tai pirmosios pagalbos būdas, naudojant įvairią tvarsliaivą (bintą, sterilius ir nesterilius tvarščius, pleistrą, tvarstomąsias skareleles ir parankines priemones) uždengiant žaizdą.
- 47. **Žaizdų tvarstymo tikslas:**

47.1. apsaugoti žaizdą nuo aplinkos užkrato;

47.2. sustabdyti kraujavimą;

47.3. sumažinti skausmą;

47.4. sugerti išsiskiriantį kraują ar skystį.

48. Žaizdų tvarstymo pagrindai:

48.1. tvarstyti pradedame nuo tvarsčio galo;

48.2. tvarsčio plotis parenkamas atsižvelgiant į žaizdą;

48.3. tvarstoma nuo plonesnės kūno dalies link storesnės;

48.4. tvarstis turi lygiai priglusti prie kūno;

48.5. tvarstyti nestipriai, kad nespaustų kraujagyslių ir nervų;

48.6. negalima mazgo rišti ties žaizda;

48.7. būtina patikrinti ar nesutriko kraujotaka.

49. Žaizdų tvarstymo būdai:

49.1. žiedinis būdas (tinka tvarstant ranką, koją, kaktą, kaklą);

49.2. spiralinis būdas (tinka tvarstant lygias kūno dalis: pirštus, žastą, krūtinę, pilvą);

49.3. spiralinis bėgamasis su perlenkimais (toks būdas tinka pailgoms nevienodo dydžio dalims tvarstyti);

49.4. kryžminis aštuoniukės formos būdas (tvarstomi sąnariai);

49.5. tvarstymas skarelėmis (tinka tvarsčiui fiksuoti, galūnei įtvirtinti);

49.6. sterilios karelės gali būti naudojamos kaip tvarstis žaizdai uždengti.

50. Sutvarsčius žaizdą, jeigu reikia, kviesti greitąją medicinos pagalbą tel 112 arba vežti į gydymo įstaigą.

VIII SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA NUDEGUS

51. Nudegimai skirstomi pagal juos sukėlusią priežastį, gylį, vietą ir sunkumą.

52. Nudegimai pagal juos sukėlusią priežastį klasifikuojami: terminis, elektrinis, cheminis, radiacinis veiksnys.

53. Nudegimai pagal jų gylį klasifikuojami: paviršinis, vidutinio gylio, gilusis.

54. Nudegimai pagal juos sukėlusią priežastį gali būti:

54.1. dėl temperatūros poveikio (ugnies, įkaitusių daiktų dalių, karštų skysčių, garų ir pan.);

54.2. dėl ultravioletinių, jonizuojančių spindulių;

54.3. elektros srovės;

54.4. cheminių medžiagų.

55. Kritinių nudegimų požymiai:

55.1. gilūs nudegimai apimantys plaštakas, pėdas, veidą, viršutinius kvėpavimo takus ir lytinius organus;

55.2. gilūs nudegimai apimantys daugiau kaip 10% kūno paviršiaus;

55.3. vidutinio gylio nudegimai apimantys daugiau kaip 30 % kūno paviršiaus;

55.4. nudegimai susiję su kvėpavimo takų nudegimu.

56. Vidutinio sunkumo nudegimų požymiai:

- 56.1. gilūs nudegimai apimantys nuo 2 % iki 10 % kūno paviršiaus ploto;
- 56.2. vidutinio gylio nudegimai apimantys nuo 15% iki 30 % kūno paviršiaus ploto;
- 56.3. paviršiniai nudegimai, apimantys daugiau kaip 50 % kūno paviršiaus ploto.

57. Lengvų nudegimų požymiai:

- 57.1. gilūs nudegimai apimantys mažiau kaip 2 % kūno paviršiaus ploto;
- 57.2. vidutinio gylio nudegimai, apimantys mažiau kaip 15 % kūno paviršiaus ploto;
- 57.3. paviršiniai nudegimai, apimantys mažiau kaip 50 % kūno paviršiaus ploto.

58. Pirmoji pagalba esant terminiam nudegimui:

- 58.1. nutraukti žalojantį aukštos temperatūros poveikį;
- 58.2. vėsinti nukentėjusįjį kambario temperatūros vandeniu mažiausiai 10 - 30 min.;
- 58.3. vėsinimo metu numauti apyrankes, žiedus ir kt. daiktus, kurie, prasidėjus audini tinimui, galėtų spausti nudegusią vietą;
- 58.4. vėsinant nukentėjusįjį vertinti jo būklę ir teikti pagalbą, vadovaujantis ABC principu;
- 58.5. stebėti ar neatsiranda šoko požymių;
- 58.6. nuvilkti visus karštus, smilkstančius drabužius, jeigu prilipę – apkirpti juos;
- 58.7. aptvarstyti visą nudegimo plotą sausais tvarsčiais (nedėti tvarsčių ant apdegusio veido);
- 58.8. jeigu nudegusi galūnė, įtvirti ją;
- 58.9. suteikti nukentėjusiajam patogią padėtį;
- 58.10. kvieisti greitąją medicinos pagalbą tel. 112, stebėti nukentėjusiojo būklę.

59. Pirmoji pagalba esant cheminiam nudegimui:

- 59.1. skubiai nusausinti skysta chemine medžiaga paveiktą vietą arba nubraukti sausas chemines medžiagas nuo kūno paviršiaus (saugoti savo rankas, užsimauti pirštines arba panaudoti kitą skysčiui nelaidžią medžiagą);
- 59.2. gausiai plauti nudegusią vietą vandeniu (geriausia tekančiu);
- 59.3. apnuoginti nudegusią vietą, uždengti steriliu tvarsčiu, sutvarstyti;
- 59.4. skubiai organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.

60. Veiksmai paveikus elektros srovei:

- 60.1. prisilietus prie įtampą turinčių įrenginių, prasideda savaiminis mėšlungiškas raumenų susitraukimas;
- 60.2. jei nukentėjusysis laiko laidą rankose, pirštai gali jį taip stipriai suspausti, kad bus neįmanoma jo išlaisvinti;
- 60.3. jei nukentėjusysis asmuo liečia įrenginį, kuriuo teka elektros srovė, pirmiausia reikia skubiai jį išlaisvinti;
- 60.4. reikia atsiminti, kad negalima liesti srovės veikiamo žmogaus, nenaudojant būtinų atsargumo priemonių (Tai pavojinga gyvybei! Būtina nedelsiant išjungti įrenginį);
- 60.5. jei nukentėjusysis asmuo yra aukštai, įrenginį išjungus ir jį išlaisvinus nuo elektros srovės, jis gali nukristi, todėl reikia imtis priemonių, užtikrinančių, kad nukentėjusysis krisdamas dar labiau nesusižalotų;
- 60.6. išjungus įrenginį, kartu gali būti išjungtas ir elektros apšvietimas, todėl reikia pasirūpinti apšvietimu iš kitų šaltinių.

60.7. jeigu įrenginio išjungti negalima, reikia imtis priemonių atskirti nukentėjusį nuo liečiamų dalių, kuriomis teka elektros srovė.

60.8. Nutraukus elektros srovės poveikį:

60.8.1. skubiai įvertinti sąmonę, kvėpavimą ir kraujotaką;

60.8.2. palaikyti kvėpavimo takus atvirus;

60.8.3. jeigu reikia, gaivinti;

60.8.4. vėsinti nudegusią vietą;

60.8.5. nuvilkti (apkirpti) apdegusius drabužius, numauti apyrankes, žiedus ir kt. daiktus, kurie, prasidėjus audinių tinimui, galėtų spausti nudegusią vietą;

60.8.6. tolesni veiksmai – kaip patyrus terminį nudegimą.

61. Teikiant pirmąją pagalbą nudegus, draudžiama:

61.1. plėšti drabužius nuo nudegusios vietos, jei jie prilipę (tokiu atveju, sterilų tvarstį dėti ar jų);

61.2. pradurti pūsles;

61.3. dėti ledą ant nudegusios vietos;

61.4. tvarstyti veido.

62. Nudegus akis reikia gausiai plauti tekančiu vandeniu 15–20 min.

IX SKYRIUS

PIRMOJI PAGALBA PERKAITUS, IŠTIKUS SAULĖ SMŪGIUI

63. Perkaitimas – tai būklė, kai sutrinka kūno temperatūros reguliacijos mechanizmas.

64. Aukštos temperatūros poveikis gali būti trejopas:

64.1. šiluminiai traukuliai: (apatinių galūnių, nugaros, pilvo traukuliai ir didelis prakaitavimas);

64.2. šiluminis išsekimas (galvos skausmas, silpnumas, svaigulys, pykinimas, spazmai, euforija, nerimas ar apatija, mieguistumas, odos blyškumas, šalta ir drėgna oda);

64.3. šiluminis smūgis (galvos skausmas, svaigimas silpnumas, svaigulys, pykinimas, gali būti vėmimas, paraudusi sausa ir karšta oda, nukentėjusysis nebep prakaituoja, dažnas ir stiprus pulsas, aukštesnė kaip 40° temperatūra, trinka sąmonė).

65. Pirmoji pagalba esant šiluminiam išsekimui:

65.1. nunešti nukentėjusį į vėsią vietą;

65.2. atpalaiduoti arba nuvilkti drabužius, nuauti batus;

65.3. suvilgyti kūną vėsiu vandeniu, vėdinti;

65.4. duoti gerti pasūdyto vandens;

65.5. pakelti kojas aukščiau širdies lygio;

65.6. kviesti greitąją medicinos pagalbą, stebėti nukentėjusį.

66. Pirmoji pagalba esant šiluminiam smūgiui:

66.1. nunešti nukentėjusį į vėsią vietą;

66.2. skubiai kviesti greitąją medicinos pagalbą;

66.3. atlaisvinti arba nuvilkti drabužius;

66.4. esant galimybei, suvynioti į šaltą, drėgną paklodę, aktyviai vėdinti;

66.5. masažuoti galūnes ir odą;

- 66.6. pakelti kojas aukščiau širdies lygio;
- 66.7. jeigu sąmoningas, duoti lėtai išgerti bent stiklinę vandens.

67. Saulės smūgio požymiai:

- 67.1. galvos skausmas;
- 67.2. spengimas ausyse;
- 67.3. mirgėjimas akyse;
- 67.4. padažnėjęs kvėpavimas ir pulsas;
- 67.5. pykinimas ar vėmimas;
- 67.6. apatija;
- 67.7. išbalusi oda;
- 67.8. pila šaltas prakaitas;
- 67.9. bendras silpnumas;
- 67.10. aukšta kūno temperatūra;
- 67.11. sąmonės pritemimas ir net netekimas.

68. Pirmoji pagalba saulės smūgio atveju (jei nukentėjęs sąmoningas):

- 68.1. nuvesti nukentėjusį į pavėsį;
- 68.2. paguldyti arba pasodinti nukentėjusį;
- 68.3. atlaisvinti nukentėjusiojo drabužius;
- 68.4. nukentėjusiojo veidą apipurkšti vėsiu vandeniu;
- 68.5. ant nukentėjusiojo galvos uždėti šaltą kompresą;
- 68.6. nukentėjusiajam duokite atsigerti vandens.

69. Pirmoji pagalba saulės smūgio atveju (jei nukentėjęs nesąmoningas):

- 69.1. paguldyti nukentėjusį į stabilią šoninę padėtį;
- 69.2. vėdinti nukentėjusį;
- 69.3. kuo skubiau organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.

X SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA NUŠALUS

70. Nušalimai priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgmės, vėjo stiprumo, laiko, kurį žmogus praleidžia toje aplinkoje.

71. Lokalūs šalčio sukelti pažeidimai skirstomi į:

71.1. nuožvarbą (galima pažinti iš pažeistoje vietoje esančios patinusios, raudonos, jautrios ir niežtinčios odos);

71.2. „apkasų pėdą“ (jai būdinga tai, kad pažeistų pėdų dalys būna šaltos ir beskausmės, kartais sustingusios, gali atsirasti deginantis skausmas, vėliau oda išblykšta, ant jos atsiranda melsvų dėmių, gali atsirasti pūslių);

71.3. nušalimą (bet kurios kūno dalies jautrumo netekimą, staigų pabalimą, vėliau paraudimą, pūslių atsiradimą, tinimą, pažeistų vietų nejautrumą skausmui).

72. Pirmoji pagalba nuožvarbų atveju:

- 72.1. palaikyti pažeistą vietą prie savo kūno kelias minutes, kad apšiltų;
- 72.2. šildyti pažeistą kūno dalį stipriai spaudžiant rankomis arba glaudžiant prie savo kūno;
- 72.3. netrinti ir nemasažuoti, o spaudyti, maigyti.

73. Pirmoji pagalba pėdų nušalimo atveju:

73.1. nuvilkti spaudžiančius drabužius, nuauti batus, nuimti papuošalus bei kitus spaudžiančius daiktus;

73.2. šildyti pažeistas kūno dalis rankomis;

73.3. jei yra galimybė pervilkinti sausais laisvais drabužiais, apkloti šiltais apklotais;

73.4. kuo greičiau organizuoti gabenimą į gydymo įstaigą.

74. Pirmoji pagalba nušalimo atveju:

74.1. šildyti pažeistas kūno dalis rankomis;

74.2. ant veido, ausų ir nosies uždėti rankas paties nukentėjusiojo;

74.3. jei nušalo rankos, atsegti megztinį ir nukentėjusiojo rankas priglausti prie kūno, po to užsegti, kad neprarastų kūno šilumos;

74.4. atlaisvinti arba nuvilkti veržiančius drabužius;

74.5. apkloti, masažuoti, mankštinti;

74.6. galima pamerkinti nušalusią kūno dalį į 38–40 laipsnių vandenį;

74.7. pakelti pažeistas kūno dalis, kad sumažėtų tinimas;

74.8. organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.

XI SKYRIUS PIRMOJI PAGALBA IŠTIKUS ŠOKUI

75. Šokas – gyvybei pavojinga būklė, atsirandanti, sutrikus kraujotakai. Šokas gali būti:

75.1. sukeltas širdies ligų;

75.2. dėl nepakankamo kraujo tūrio;

75.3. sukeltas infekcijos;

75.4. anafilaksinis (dėl alerginės reakcijos);

75.5. sukeltas nervų sistemos pažeidimo.

76. Dažniausia šoko priežastis – didelis kraujo netekimas. Jei netenkama daugiau kaip 1,2 l (tai daugiau nei vienas penktadalio), išrinka šokas.

77. Kitos šoko priežastys:

77.1. sunki infekcija;

77.2. tam tikrų hormonų trūkumas;

77.3. mažas gliukozės kiekis kraujyje (hipoglikemija);

77.4. sušalimas;

77.5. sunki alerginė reakcija;

77.6. vaistų perdozavimas;

77.7. nugaros smegenų pažeidimas.

78. Šoko požymiai:

78.1. pradžioje – greitas pulsas, pilkšva, šalta oda, prakaitavimas;

78.2. šokui pasunkėjus – melsvai pilka oda, silpnumas ir galvos svaigimas, pykinimas, gali būti ir vėmimas, troškulys, dažnas ir paviršinis kvėpavimas, siūlinis silpnas pulsas;

78.3. sumažėjus smegenų aprūpinimui deguonimi, pasireiškia – neramumas ir agresyvumas, žiovulys ir žiopčiojimas (“oro gaudymas”), sąmonės netekimas, galiausiai išnyksta širdies veikla.

79. Pirmoji pagalba ištikus šokui:

- 79.1. būtina šalinti galimą šoko priežastį (pvz.: stabdyti kraujavimą);
- 79.2. paguldyti nukentėjusį ant antklodės;
- 79.3. nuraminti nukentėjusį;
- 79.4. jei nukentėjusysis nepatyrė traumos, pakelti ir palaikyti jo kojas, kad pagerėtų gyvybei svarbių organų aprūpinimas krauju;
- 79.5. jei įtariamas lūžimas, įtvirtinti;
- 79.6. apkloti nukentėjusiojo kūną ir kojas;
- 79.7. kviesti greitąją medicinos pagalbą;
- 79.8. jei nukentėjusysis vemia, ar jam teka seilės, pasukti galvą į šoną;
- 79.9. sekti pagrindines gyvybines funkcijas (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą).

80. Anafilaksinis šokas – tai sunki alerginė reakcija, sutrikdanti viso organizmo veiklą.

Anafilaksinio šoko priežastiniai veiksniai:

- 80.1. tam tikros medžiagos kontaktas su oda, ar patekus į kvėpavimo takus;
- 80.2. specifinio vaisto injekcija;
- 80.3. vabzdžio įkandimas;
- 80.4. maistas (žemės riešutai, citrusiniai, šokoladas).

81. Anafilaksinio šoko požymiai (pagal sistemas):

- 81.1. kraujospūdžio kritimas, greitas širdies plakimas (širdies ir kraujagyslių sistema);
- 81.2. ryškus dusulys (kvėpavimo sistema);
- 81.3. bėrimas, veido, vokų, liežuvio patinimas (oda, gleivinės);
- 81.4. pilvo skausmai, viduriavimas, vėmimas (virškinimo sistema);
- 81.5. nerimas.

82. Pirmieji požymiai gali atsirasti po kelių sekundžių ar minučių, bet gali ir po 2 valandų.

83. Pirmoji pagalba ištikus anafilaksiniam šokui:

- 83.1. kviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112;
- 83.2. paklausti ar nukentėjusysis turi reikiamus vaistus, jei turi, padėti jais pasinaudoti;
- 83.3. jei žmogus sąmoningas, suteikti jam patogią padėtį, jeigu dūsta – pasodinti, jei jaučia silpnumą, svaigsta galva – paguldyti ir pakelti kojas;
- 83.4. nuraminti nukentėjusį;
- 83.5. atpažinę šoką teikti nukentėjusiajam pagalbą.

XII SKYRIUS

PIRMOJI PAGALBA LŪŽUS KAULAMS

- 84. Kaulo lūžis – kaulo vientisumo suardymas. **Kaulo lūžio požymiai:**
- 84.1. lūžio vietoje gali būti patinimas, kraujosruvos;
- 84.2. galūnės deformacija;
- 84.3. skausmas, galūnės judrumas neįprastoje vietoje;
- 84.4. galūnė gali būti sutrumpėjusi ar neįprastai pakreipta, persukta, sulenкта;
- 84.5. lūžio vietoje jaučiamas ar girdimas traškėjimas;
- 84.6. sutrikusi pažeistos galūnės funkcija;
- 84.7. dėl kai kurių lūžių (šlaunikaulio, dubens kaulų) gali ištikti šokas.

85. Pirmoji pagalba kaulo lūžio atveju:

- 85.1. perspėti nukentėjusį, kad nejudintų pažeistos kūno dalies;
- 85.2. prilaikyti nukentėjusiojo sužalotą vietą savo rankomis;
- 85.3. įtvirtinti pažeistą vietą taip, kad sąnariai aukščiau ir žemiau pažeidimo vietos nejudėtų;
- 85.4. naudoti turimas priemones – standžius, kietus ir siaurus įtvarus (lenteles, surištas medžių šakeles, kartoną, standžiai susuktus laikraščius ir žurnalus);
- 85.5. įtvaramą pritvirtinti prie sužeistos kūno dalies tvarsčiu ar skarele;
- 85.6. pažeistą galūnę pritvirtinti prie šalia esančios sveikos kūno dalies ar galūnės;
- 85.7. kvieisti greitąją medicinos pagalbą;
- 85.8. įtariant šoką, pakelti sveikąją koją, sužeistosios galūnės nejudinti.

XIII SKYRIUS**PIRMOJI PAGALBA Į KŪNĄ ĮSMIGUS AR PATEKUS SVETIMKŪNIUI****86. Pirmoji pagalba esant į kūną įsmigusiems daiktams:**

- 86.1. jei iš žaizdos kyšo koks nors svetimkūnis – jokių būdu nebandyti jo traukti, nes gal prasidėti ar sustiprėti vidinis kraujavimas;
- 86.2. jeigu nukentėjusysis sąmoningas leisti jam būti tokioje padėtyje, kuri jam yra patogiausia;
- 86.3. stengtis išlaikyti stabilią nukentėjusiojo padėtį;
- 86.4. nuraminti nukentėjusį;
- 86.5. svetimkūnį uždengti tvarsčiu, aplink dėti tvarsčių arba švaraus audinio ritinėlius, kurie uždengtų visą svetimkūnį, švelniai nespaudžiant sutvarstyti;
- 86.6. skubiai kvieisti greitąją medicinos pagalbą arba organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.

87. Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į akis:

- 87.1. patekus į akį cheminėms medžiagoms, plauti ją 30 – 40 minučių šaltu arba drungnu tekančiu vandeniu;
- 87.2. vandeniu išplovus akis, šlapiais tamponais kruopščiai nuvalyti odos vietas, ant kurių pateko nuodingas skystis;
- 87.3. tą patį reikia padaryti ir nudegus akis;
- 87.4. patekus dulkėms, taip pat plauti vandeniu, nukentėjusiajam patarti dažnai mirksėti, nes mirksint dulkės pasišalina;
- 87.5. į akį patekus svetimkūniui, perspėti nukentėjusį, kad netrintų akies;
- 87.6. dviem pirštais išplėsti akį, svetimkūnį esantį vidiniame apatinio voko paviršiuje pašalinti švaria drėgna servetėle;
- 87.7. akį nupilti vandeniu, galvą laikyti taip, kad vanduo nepatektų į sveiką akį;
- 87.8. jeigu giliai akyje įstrigusi drožlė ar kristalas, nieko nedaryti (mėginant iš akies traukti svetimkūnį, galima nepagydomai pažeisti akies audinius).

88. Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į nosį:

- 88.1. nuraminti nukentėjusį;
- 88.2. liepti nukentėjusiajam kvėpuoti pro burną;

88.3. gabenti nukentėjusį į gydymo įstaigą.

89. Pirmoji pagalba svetimkūniui patekus į ausį:

89.1. nuraminti nukentėjusį;

89.2. jei ausyje gyvas vabzdys, pilti į nukentėjusio ausį šilto vandens;

89.3. uždengti nukentėjusio ausį tvarščiu ir, kiek įmanoma greičiau, gabenti į gydymo įstaigą.

XIV SKYRIUS

PIRMOJI PAGALBA APSINUODIJUS

90. Apsinuodijimo būdai:

90.1. pro burną (nuryjant);

90.2. per odą;

90.3. įkvepiant;

90.4. per akis;

90.5. injekciniu būdu (suleidus ar įgėlus).

91. Apsinuodijus reikėtų nedelsiant skambinti Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonu 85 236 20 52 arba 8 687 53 378.

92. Norėdami gauti veiksmingą patarimą, jūs turėtumėte atsakyti į šiuos klausimus:

92.1. kas apsinuodijo – suaugęs ar vaikas (amžius ir svoris);

92.2. kaip tai atsitiko;

92.3. kiek nukentėjusiųjų;

92.4. kada tai atsitiko;

92.5. kokia medžiaga ir koks kiekis;

92.6. ar yra apsunkinančių aplinkybių.

93. Pirmoji pagalba nuodams patekus pro burną:

93.1. užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, kvėpavimą ir kraujotaką;

93.2. jei įmanoma, nustatyti, kuo apsinuodyta;

93.3. pasirūpinti, kad nukentėjusysis kuo greičiau patektų į ligoninę;

93.4. jei nukentėjusysis yra sąmoningas, paklausti ko, kiek ir kada jis gėrė / vartojo;

93.5. kviesti greitąją medicinos pagalbą;

93.6. jei matomas lūpų nudegimas, kol atvyks greitoji medicinos pagalba, duoti nukentėjusiajam mažais gurkšneliais išgerti stiklinę šalto vandens;

93.7. nebandyti sukelti vėmimo, nebent nukentėjusysis yra sąmoningas, ką tik apsinuodijo ir tai daryti rekomendavo specialistas.

94. Pirmoji pagalba nuodams patekus per odą (atpažinimo būdai):

94.1. gali būti įvairaus pobūdžio skausmas;

94.2. šalia nukentėjusiojo būna cheminių medžiagų ir jų pakuočių;

94.3. iš karto ar truputį vėliau atsiranda pažeistos vietos paraudimas, patinimas, pūslių.

95. Pirmoji pagalba nuodams patekus per odą atveju:

95.1. patikrinti, ar aplinka šalia nukentėjusiojo yra saugi teikti pagalbą;

95.2. užtikrinti savo ir nukentėjusiojo saugumą;

95.3. jei nukentėjusiojo drabužiai labai užteršti, prieš plaudami atsargiai juos nuvilkti;

95.4. pažeistą vietą plauti dideliu kiekiu tekančio vandens apie 20 minučių;

- 95.5. ant nudegimo žaizdų uždėti sausą švarų tvarstį ir atsargiai sutvarstyti;
 95.6. organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą.

96. Apsinuodyti įkvepiant galima:

- 96.1. dujomis;
 96.2. aerozoliais;
 96.3. smalkėmis;
 96.4. amoniako garais;
 96.5. anglies dvideginiu;
 96.6. sieros vandeniliu;
 96.7. pesticidais.

97. Apsinuodijimo požymiai:

- 97.1. bendras silpnumas;
 97.2. galvos skausmas;
 97.3. triukšmingas ir pasunkėjęs kvėpavimas;
 97.4. odos ir gleivinės spalvos pokyčiai;
 97.5. pykinimas, vėmimas;
 97.6. sąmonės sutrikimas.

98. Pirmoji pagalba apsinuodijimo atveju:

- 98.1. užtikrinti pakankamą kvėpavimą;
 98.2. kviesti greitąją medicinos pagalbą (gaisro atveju nedelsiant skambinti tel. 112 ir kviesti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą bei greitąją medicinos pagalbą);
 98.3. jei nėra pavojaus Jūsų saugumui, kuo greičiau išvesti nukentėjusį iš apnuodytos patalpos, atsagstyti jo apykaklę, pasirūpinti, kad patektų daugiau gryno oro;
 98.4. jei žmogus apsinuodijo automobilio išmetamosiomis dujomis uždaroje patalpoje, prieš įeinant į patalpą, plačiai atverti duris, kad nuodingos dujos išsisklaidytų;
 98.5. jei surastas nesąmoningas žmogus kanalizacijos šulinyje, duobėje, nereikia bandyti leisti žemyn patiems, nes galima apsinuodyti ir prarasti sąmonę, skambinti tel. 112, kviesti specialiąsias tarnybas;
 98.6. jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverti kvėpavimo takus ir nustatyti, ar nukentėjusysis kvėpuoja;
 98.7. jei nukentėjusysis nekvėpuoja, įpūsti jam oro ir pasirengti atlikti krūtinės ląstos paspaudimus;
 98.8. jei nukentėjusysis kvėpuoja, paguldyti į stabilią šoninę padėtį.

99. Pirmoji pagalba nuodams patekus per akis:

- 99.1. jeigu yra, užsimauti apsaugines pirštines;
 99.2. padėti nukentėjusiajam plauti pažeistą akį mažiausiai 20 min. šalto vandens srove, jei nukentėjusysis dėl skausmo negali prasimerkti, švelniai, bet tvirtai pramerkti pažeistos akies vokus (saugoti sveikąją akį);
 99.3. uždėti tvarstį ant pažeistosios akies ir sutvarstyti abi akis.

100. Apsinuodijimas įgėlus ar įkandus. Įgėlus vabzdžiui, visada reikia stebėti, ar atsiranda alerginės reakcijos, kurios gali progresuoti iki anafilaksinio šoko.

101. Apsinuodijimo įgėlus ar įkandus požymiai:

- 101.1. stiprus, aštrus skausmas įgėlimo vietoje;

101 .2. įgeltos vietos paraudimas ir patinimas;

101.3. dusulys;

101.4. veido tinimas;

101 .5. dilgėlinis viso kūno bėrimas.

102. Pirmoji pagalba apsinuodijimo įgėlus ar įkandus atveju:

102 .1. jei įkandimo vietoje yra likęs geluonis, atsargiai nubraukti jį nagu ar bukąja peilio geležtės dalimi;

102.2. pakelti įgeltą galūnę, uždėti įkandimo vietoje ledo, laikyti 10 min.;

102.3. jei patinimas plinta ar būklė sunkėja, kviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112.

103. Gyvatės įgėlimo požymiai:

103.1. pora taškinių dantų žymių;

103.2. stiprus skausmas, paraudimas ir patinimas;

103.3. pykinimas ir vėmimas;

103.4. sutrikęs regėjimas;

103.5. seilėtekis ir padidėjęs prakaitavimas;

103.6. pasunkėjęs kvėpavimas ar net jo sustojimas.

104. Pirmoji pagalba gyvatės įgėlimo atveju:

104.1. kviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112.

104.2 nukentėjusįjį atsargiai paguldyti, nuraminti, paprašyti nejudėti;

104.3 numauti nuo įgeltos galūnės žiedus, nusekite laikrodį;

104.4. nuplauti įkandimo vietą;

104.5. įkastą galūnę standžiai sutvarstyti, tvarstyti pradėti nuo įgėlimo vietos galvos link;

104.6. sutvarstyta kūno dalį įtvirtinti;

104.7. kviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112.

XV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

105. Už pirmosios pagalbos organizavimą ir teikimą lopšelyje-darželyje atsakingas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdamas sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje ir pedagogai.
